

Por favor, lee con detenimiento las instrucciones

MANACIL

Medicamento para tratar peces de agua dulce

Medicamento para animales (peces ornamentales de agua dulce)

Declaración del farmacéutico:

Solución de ingredientes activos farmacológicamente para tratar agua de acuarios.

Mezcla de componentes activos en mg/ml:

Brlliantgrün 48, 4,4'-Benzyliden-Bis(n,n-Dimethylaniline) 9.6, Acriflavin HCL 4, Matanilgelb 0.05

Empresa farmacéutica:

Manaus-Aquarium, Rügnerstrasse 73, D-64319 Pfungstadt.

Campo de aplicaciones: MANACIL es muy efectivo combatiendo (Ichthyophthirius multifiliis) así como contra parásitos monocelulares de la piel de los peces. También combate la Chilodonella, Ichthyobodo necator, Trichodina....etc.

Sintomatología:

Indicado en afecciones del punto blanco en piel y aletas (Ichthyo). Todos los demás patógenos mencionados arriba muestran unas capas blancas o grisáceas recubriendo la piel de los peces.

En general si el pez rechaza la comida. Si tienen las aletas pegadas, saltan fuera del agua o se rascan de forma constante contra los adornos del acuario.

Es importante medicar a los peces después de un buen diagnóstico de los síntomas para prevenir la infección de los peces por los parásitos mencionados arriba. Es recomendable un diagnóstico por microscopio si es posible.

Medidas preventivas:

No usar MONACIL en combinación con otros medicamentos. Si los peces han sido tratados con otro medicamento antes, será necesario hacer un cambio de agua antes del tratamiento.

Pon atención a la calidad del agua y reduce la contaminación orgánica por productos químicos en descomposición haciendo cambios de agua regulares en el acuario.

Filtros muy contaminados deben ser limpiados antes del tratamiento. Filtros y conductos de aire para el aporte de oxígeno deben estar en funcionamiento.

Las lámparas germicidas UVA deben ser apagadas durante el tratamiento.

No usar ninguna filtración química (por ejemplo carbón activado, resinas antifosfatos....etc.) en los filtros durante el tratamiento, para evitar posibles interacciones con las sustancias activas del medicamento.

En caso de complicaciones, detén el tratamiento con MONACIL y haz un cambio de agua – como normalmente haces después del tratamiento e informa en tu tienda de lo ocurrido.

Dosificación y aplicaciones:

Usa el vaso medidor incluido en el envase para dosificar el MONACIL y esparce la dosis por la superficie del agua.

1º día: 1 ml. por 40 litros de agua

3º día: 1ml. por 40 litros de agua

En caso de infección grave de parásitos, puedes usar de nuevo 1 ml. por 40 litros en el 5º día.

No sobredosificar MONACIL – los peces debilitados por la enfermedad, pueden reaccionar sensiblemente.

Contraindicaciones y reacciones adversas:

MANACIL es un nuevo producto con una muy buena compatibilidad.

Reacciones adversas, no son conocidas.

Los acuariófilos deberán informar al veterinario o farmacéutico y al productor acerca de cualquier reacción adversa que observen.

Advertencia Importante:

¡Mantener fuera del alcance de los niños!

No usar el medicamento con animales que son para consumo humano.

Manténlo en su envase original, en lugar fresco y oscuro.

No usar una vez haya caducado.

MANACIL puede aportar color al agua.

DISCUSLAND SL.

Distribuidor Oficial para España y Portugal

Email: info@discusland.net

Movil: 665727834

TF:944924582

Web: www.discusland.net